

Samenvatting van hydrocortison, oxytetracycline en polymyxine B in het oog

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Oxytetracycline en polymyxine B zijn antibiotica. Ze bestrijden veel soorten bacteriën. Hydrocortison remt ontstekingen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij ooginfecties.

Werkt binnen 3 dagen. Ziet u na 3 dagen nog geen verbetering? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruik

Hydrocortison, oxytetracycline en polymyxine B is er als oogzalf. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

1. Was uw handen en droog ze af.
2. Pak de tube alsof u een pen vasthoudt.
3. Trek met uw vingertoppen van uw andere hand het onderste ooglid naar beneden. Er ontstaat een 'gootje'.
4. Buig uw hoofd achterover, maar blijf in de spiegel kijken.
5. Breng de tube boven het gootje.
6. Knijp in de tube en laat een sliert zalf van ongeveer een 1 centimeter in het gootje vallen.
7. Buig uw hoofd terug en knipper een paar keer.
8. Schroef het dopje terug op het flesje en was uw handen.

Let op! Draagt u contactlenzen? Doe ze uit voor u de zalf aanbrengt. Vraag bij uw apotheek na hoe lang u ze daarna uit moet laten.

Oogzalven zijn niet makkelijk om te gebruiken. Een apotheekmedewerker kan u laten zien hoe het moet. Of **bekijk het instructiefilmpje** op deze site.



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van wazig zien. Dit gaat na 1 tot 2 uur over.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën over.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt. **Let op!** Rijd géén auto als u wazig ziet.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

