

Samenvatting van miconazol met hydrocortisonacetaat

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Miconazol doodt schimmels en gisten.
Hydrocortisonacetaat remt ontstekingen en zorgt voor minder schilfering, jeuk en zwellingen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij jeukende huidinfecties met schimmel, zoals voetschimmel.

Roodheid en jeuk worden binnen een paar dagen minder.

Meestal gebruikt u de combinatie van miconazol met hydrocortisonacetaat niet langer dan 5 tot 10 dagen. Daarna moet u nog een paar weken een huidmedicijn gebruiken met alleen miconazol.

Gebruik

Miconazol met hydrocortisonacetaat is er als crème. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Smeer de crème in een dunne laag op de ontstoken plek. Smeer ongeveer 2 cm breder dan de ontstoken plek.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van een rode, geïrriteerde of branderige huid.

Deze bijwerkingen gaan snel over. Blijft u last houden? Overleg dan met uw arts.

Waarschuwingen



Bent u overgestapt op een huidmedicijn met alleen miconazol? Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog schimmels, gisten of bacteriën over. Is uw huid beter? Blijf miconazol nog 1 week smeren.



Let op! Gebruik dit huidmedicijn niet als u de bloedverdunners fenprocoumon of acenocoumarol gebruikt. Overleg met uw arts of apotheker.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Let op! Smeert u dit medicijn op of rond de tepel? Maak voor de borstvoeding de tepel dan schoon met afgekoeld gekookt water.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

