

Samenvatting van algeldraat met magnesiumhydroxide

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Algeldraat en magnesiumhydroxide binden maagzuur. Hierdoor wordt uw maagzuur minder zuur.

Algeldraat met magnesiumhydroxide werkt bij maagklachten. Zoals brandend maagzuur, pijn door opkomend maagzuur of een opgeblazen gevoel met misselijkheid.

De maagpijn en het opgeblazen gevoel worden binnen een kwartier minder. Daarna werkt het 1 tot 3 uur.

Gebruik

Algeldraat met magnesiumhydroxide is er als drank in fles, drank in zakjes en kauwtabletten. In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Neem dit medicijn 1 uur na elke maaltijd en voor u gaat slapen.

Gebruik algeldraat met magnesiumhydroxide alleen als u maagklachten heeft. Stop als de maagklachten zijn verdwenen.

Drank in fles

Schud de fles goed.

Meet de juiste hoeveelheid af met de maatbeker of maatlepel.

Drank in zakjes

Kneed het zakje goed. Doe daarna de inhoud van het zakje op een lepel en slik door.

Kauwtabletten

De tabletten goed fijnkauwen en doorslikken. Dit medicijn werkt het beste als het fijn verdeeld in de maag komt.

Heeft u tussendoor ook klachten? Neem dit medicijn dan extra in. Doe dit dan niet vaker dan een keer in de 2 uur. Blijft u maagklachten houden? Raadpleeg dan uw arts.

Bijwerkingen

U kunt misselijk worden of verstopping krijgen. Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Algeldraat met magnesiumhydroxide en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met algeldraat met magnesiumhydroxide.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

