

Samenvatting van calciumcarbonaat met magnesiumsubcarbonaat

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Calciumcarbonaat met magnesiumsubcarbonaat bindt maagzuur. Dit maakt de maaginhoud minder zuur.

Calciumcarbonaat met magnesiumsubcarbonaat werkt bij maagklachten. Zoals brandend maagzuur, pijn door opkomend maagzuur of een opgeblazen gevoel met misselijkheid.

Uw klachten worden binnen een kwartier minder. Daarna werkt het 1 tot 3 uur

Gebruik

Calciumcarbonaat met magnesiumsubcarbonaat is er als kauwtablet.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Neem dit medicijn 1 uur na elke maaltijd en voor u gaat slapen.

Gebruik calciumcarbonaat met magnesiumsubcarbonaat alleen als u maagklachten heeft. Stop als de maagklachten zijn verdwenen. Gebruik dit medicijn niet langer dan **2 weken** achter elkaar.

Zuig de tabletten op of kauw ze goed fijn voor u ze doorslikt. Dit medicijn werkt het beste als het fijn verdeeld in de maag komt.

Heeft u tussendoor ook klachten? Neem dit medicijn dan extra in. Doe dit dan niet vaker dan 1 keer elke 2 uur. Blijft u maagklachten houden? Raadpleeg dan uw arts.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Zure oprispingen (boeren). Dat komt omdat dit medicijn gas vormt in de maag.
- Diarree
- Verstopping

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Calciumcarbonaat met magnesiumsubcarbonaat en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met calciumcarbonaat met magnesiumsubcarbonaat.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

