

Samenvatting van **hydrocortisonacetaat op de huid**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Hydrocortisonacetaat is een hormoon uit de bijnierschors (corticosteroïd). Het remt ontstekingen en maakt schilfers, jeuk en zwellingen minder.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij huidziektes met ontstekingen, zoals:

- eczeem
- eczeem met schilfers (seborroïsch eczeem)
- jeuk

U heeft binnen een paar uur minder jeuk. De schilfers en rode huid worden na een paar dagen minder.

Gebruik

Hydrocortisonacetaat op de huid is er als crème, zalf en huidemulsie.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Smeer dit medicijn op de plekken waar u last van heeft. U mag dit medicijn alleen op uw oogleden of rond uw oog smeren als uw arts dat heeft verteld.

Let op! Dit medicijn mag niet in uw ogen komen. Komt het per ongeluk in uw ogen? Spoel uw ogen dan goed met water.

Uw arts of apotheker legt u uit hoe u dit medicijn moet smeren. Gebruik het topje van uw vinger om te kijken hoeveel u moet gebruiken.



Smeer niet te dik of te dun. Anders krijgt u bijwerkingen of werkt dit medicijn niet goed. De huidemulsie mag er niet afdruipten.

Bekijk op Apotheek.nl het plaatje met uitleg over hoeveel u moet smeren. Scan de QR-code hiernaast om het plaatje te zien.



Gebruik ook elke dag een **vette crème** tegen irritatie van de huid. De ontstoken plekken blijven dan langer weg.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van een dunnere huid. Krijgt u last van wondjes of blauwe plekken?

Stop dan met dit medicijn en bel uw arts.

Let op! Heeft u last van een **infectie op uw huid?**

Gebruik dit medicijn dan niet op de plek met een infectie. Door dit medicijn merkt u minder snel dat u een infectie op uw huid heeft. De infectie kan dan erger worden. Overleg met uw arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Let op! Smeert u dit medicijn op of rond de tepel? Smeer het dan direct ná de borstvoeding op of rond uw tepel. Was het vóór de volgende voeding weer af. Zo krijgt uw baby dit medicijn niet in de mond of op de huid.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

