

Samenvatting van **adrenaline injectie**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Adrenaline is een stofje dat het lichaam zelf maakt. Het geeft energie en uw hart gaat bijvoorbeeld sneller kloppen. Ook vernauwt adrenaline de bloedvaten, waardoor uw bloeddruk omhoog gaat.

Uw arts schrijft dit medicijn voor om te gebruiken bij anafylaxie. Dit is een heftige reactie van uw lichaam door een erge allergie. Bijvoorbeeld door noten of door een wesp- of bijensteek. Dit is levensgevaarlijk.

Door anafylaxie worden uw bloedvaten erg wijd. Hierdoor voelt u zich duizelig en valt u flauw. Ook kunt u last hebben van:

- moeite met ademen
- zwelling van uw lippen of tong
- zweten
- snelle hartslag

Adrenaline injectie zorgt dat uw bloedvaten binnen 3 tot 5 minuten weer smaller worden. Hierdoor gaat uw bloeddruk omhoog en wordt u minder duizelig.

Gebruik

In de bijsluiter leest u hoe u de injectie met adrenaline gebruikt. Zorg dat mensen in uw omgeving ook weten hoe ze adrenaline injectie moeten gebruiken.

Let op! Bel na gebruik direct het alarmnummer 112 of bel uw arts. Door adrenaline verdwijnen de ergste verschijnselen, maar uw allergie moet nog verder behandeld worden.

Twijfelt u of de allergische klachten ernstig genoeg zijn voor een adrenaline injectie? Gebruik deze dan toch. Waarschuw daarna altijd uw arts.

Het is handig om 2 adrenaline injecties te hebben. Soms werkt 1 injectie niet goed genoeg. Als dat zo is, mag u na 5 tot 10 minuten nog een tweede adrenaline injectie gebruiken.

Scan de QR-code hiernaast voor meer informatie over het gebruik op Apotheek.nl.



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- pijn op de borst
- hartkloppingen
- snelle hartslag
- hoge bloeddruk

Ook kunt u een erge infectie krijgen op de plaats van de injectie. Krijgt u last van zwelling, roodheid, warmte of pijn op de plaats van de injectie? Waarschuw dan direct een arts.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Bent u zwanger? Dit medicijn zou ervoor kunnen zorgen dat er minder bloed naar de placenta (moederkoek) gaat. Maar anafylaxie is levensgevaarlijk voor u en uw baby. Dit medicijn gebruiken is daarom in het belang van moeder en kind.



U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

