

Samenvatting van **alginezuur met zuurbindende carbonaten**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Alginezuur vormt een beschermende laag bovenop de maaginhoud. Hierdoor kan maagzuur minder makkelijk de slokdarm instromen. Zuurbindende carbonaten maken de maaginhoud minder zuur.

Alginezuur met zuurbindende carbonaten werkt bij maagklachten. Zoals brandend maagzuur, pijn door opkomend maagzuur of een opgeblazen gevoel met misselijkheid.

De maagklachten worden binnen een kwartier minder. Het werkt 4 uur lang.

Gebruik

Alginezuur met zuurbindende carbonaten is er als tabletten.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Neem dit medicijn **1 uur** na elke maaltijd en voor u gaat slapen. U kunt een extra dosis nemen als u tussendoor ook klachten heeft. Neem dit medicijn **niet vaker dan 1 keer elke 2 uur**. Houdt u maagklachten? Raadpleeg dan uw arts.

Kauw de tabletten goed fijn voor u ze doorslikt. Voor een goede werking moet het medicijn fijn verdeeld in de maag komen.

Heeft u niet altijd maagklachten? Neem het dan alleen als u maagpijn of brandend maagzuur heeft.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- zure oprispingen (boeren)
- diarree
- verstopping krijgen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Alginezuur met zuurbindende carbonaten en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met alginezuur met zuurbindende carbonaten



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

