

Samenvatting van **formoterol inhalatie**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Formoterol opent uw luchtwegen. Het maakt u minder benauwd en voorkomt nieuwe aanvallen van benauwdheid.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- astma
- longziekte COPD (chronische obstructieve longziekte)

Binnen 3 minuten na inademen van dit medicijn bent u minder benauwd. Daarna blijft formoterol 12 uur lang werken.

Gebruik

Formoterol is er als inhalatiepoeder en inhalatiespray. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Dit medicijn zit in een **inhalator**.

Dat is een apparaat om dit medicijn in te ademen. In de apotheek laten ze zien hoe dat moet.

Benauwdheidsaanvallen door inspanning

Gebruik dit medicijn 10 tot 15 minuten vóór de inspanning.

Voorkomen aanvallen van benauwdheid

Gebruik dit medicijn **elke dag** op vaste tijden. Dan vergeet u minder snel een dosis en bent u minder vaak benauwd.

Let op! Elke inhalator werkt anders. Dit medicijn werkt alleen als u het goed inademt. Laat daarom elk jaar in de apotheek controleren of u dit medicijn op de goede manier inademt.

Bekijk de **video met uitleg** op [Apotheek.nl](https://www.apotheek.nl). Daar staat uitleg voor elke soort inhalator. Scan de QR-code hiernaast om het filmpje te zien voor uw inhalator.



Vindt u het moeilijk om uw inhalator te gebruiken? Er zijn ook andere inhalatoren. Vraag uw arts of apotheker of een andere inhalator beter bij u past.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- duizelig voelen
- trillende handen
- hoesten
- hartkloppingen

Deze klachten verdwijnen binnen een paar uur. Deze bijwerkingen komen steeds minder voor als u dit medicijn langer gebruikt. Heeft u na 2 weken nog steeds last van bijwerkingen? Vraag dan uw arts om advies.

Verder kunt u last krijgen van **klachten in de mond**.

Zoals:

- geïrriteerde mond en keel
- een droge mond
- bij poederinhalator: schimmelinfecties in uw mond en keel

Spoel altijd uw mond nadat u dit medicijn heeft gebruikt. En zorg dat u dit medicijn goed inademt. Dan heeft u minder kans op deze bijwerkingen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

