

Samenvatting van **formoterol met budesonide** inhalatie

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Formoterol **opent uw luchtwegen**.

Budesonide remt ontstekingen en beschermt de luchtwegen tegen prikkels die u benauwd maken. De combinatie van formoterol met budesonide zorgt dat u minder benauwd bent. Ook voorkomt het nieuwe aanvallen van benauwdheid.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- astma
- de longziekte COPD

Formoterol met budesonide blijft 12 uur lang werken.

Gebruik

Formoterol met budesonide zit in een inhalator. Dat is een apparaat om dit medicijn in te ademen. In de apotheek laten ze zien hoe dat moet.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken. Gebruik formoterol met budesonide op vaste tijden. Dan vergeet u minder snel een dosis. Gebruik het **elke dag**. Dan bent u minder vaak benauwd.

U kunt het ook gebruiken als u ineens benauwd wordt. Binnen 3 minuten na inhalatie merkt u dat u minder benauwd bent. Soms adviseert uw arts om een ander medicijn te gebruiken als u ineens benauwd wordt. Bijvoorbeeld salbutamol.

Let op! Elke inhalator werkt anders. Dit medicijn werkt alleen als u het goed inademt. Laat daarom elk jaar in de apotheek controleren of u dit medicijn op de goede manier inademt.

Bekijk de **video met uitleg** op Apotheek.nl. Daar staat uitleg voor elke soort inhalator. Scan de QR-code hiernaast om het filmpje te zien voor uw inhalator.



Vindt u het moeilijk om uw inhalator te gebruiken? Er zijn ook andere inhalatoren. Vraag uw arts of apotheker of een andere inhalator beter bij u past.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- trillende handen
- hoesten
- hartkloppingen

Deze klachten verdwijnen binnen een paar uur. Deze bijwerkingen komen steeds minder voor als u dit medicijn langer gebruikt. Heeft u na 2 weken nog steeds last van bijwerkingen? Vraag dan uw arts om advies.

Verder kunt u last krijgen van klachten in de mond. Zoals:

- geïrriteerde mond en keel
- schimmelinfecties in uw mond en keel
- een droge mond
- hees zijn

Spoel altijd uw mond nadat u dit medicijn heeft gebruikt. En zorg dat u dit medicijn goed inademt. Dan heeft u minder kans op deze bijwerkingen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

