

Samenvatting van Metronidazol

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Metronidazol is een antibioticum. Het doodt sommige bacteriën en parasieten.

Uw arts schrijft metronidazol voor bij infecties van:

- maag en darmen
- mond, keel, galblaas en huid
- geslachtsorganen, zoals bij: trichomonas (geslachtsziekte), bacteriële vaginose en eikelontsteking.

Soms schrijven artsen het voor bij ernstige rosacea. U heeft dan felrode plekken, bultjes en puistjes in uw gezicht.

U heeft na een paar dagen minder last van de klachten.

Gebruik

Metronidazol is er als tabletten en drank. Dit medicijn wordt ook in het ziekenhuis gegeven als infuus. Deze tekst gaat alleen over de tabletten en drank.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Een kuur duurt meestal niet langer dan 14 dagen. Dit hangt af van de infectie die u heeft en hoe erg deze infectie is.

Tabletten

Slik de tabletten met een half glas water.

Drank

1. Schud de fles goed.
2. Meet de juiste hoeveelheid af met een maatlepel of maatbeker.
3. Drink deze hoeveelheid op.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- misselijk of duizelig voelen
- metaalsmaak in de mond
- geen trek in eten hebben

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën of parasieten over.



Let op! Metronidazol en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met metronidazol.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Gebruik geen alcohol als u dit medicijn gebruikt tot en met 2 dagen na de laatste dosis. Anders kunt u vervelende bijwerkingen krijgen.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Gebruikt u dit medicijn 1 keer? U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft. Het kan wel de moedermelk een nare metaalsmaak geven. Voordat u begint met dit medicijn kunt u moedermelk afkolven en invriezen in een flesje. Gebruikt u dit medicijn vaker? Overleg dan met uw arts of apotheker.