

Samenvatting van paracetamol met codeïne

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Paracetamol met codeïne is een pijnstiller.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- koorts
- matige tot hevige pijn

Paracetamol met codeïne werkt binnen 1 uur. Het blijft 6 tot 8 uur lang werken.

Gebruik

Paracetamol met codeïne is er als zetpillen. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

1. Maak de zetpil een beetje nat.
2. Breng de zetpil in uw anus (poepgat).

Gebruik paracetamol met codeïne zolang als u pijn heeft. Of gebruik het als u verwacht pijn te krijgen, zoals tijdens de slaap.

Scan de QR-code hiernaast. Daar vindt u meer uitleg hoe u de zetpillen goed kunt gebruiken.



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van verstopping in uw darmen.

Heeft u last van verstopping? Eet vezelrijke voeding en drink veel.

U kunt als u wilt ook een laxermiddel gebruiken om verstopping in uw darmen te voorkomen.

Andere bijwerkingen van paracetamol met codeïne zijn suf, slaperig en duizelig worden.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts

Waarschuwingen



Let op! U mag niet altijd autorijden als u dit medicijn gebruikt. Dit komt doordat u slaperig en duizelig kan worden. Hoelang u niet mag autorijden hangt af van hoe u dit medicijn gebruikt. Overleg met uw apotheker of arts.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

