

Samenvatting van propranolol

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Propranolol maakt uw hartslag langzamer en verlaagt uw bloeddruk. Hierdoor heeft uw hart minder zuurstof nodig.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- hoge bloeddruk
- angina pectoris (pijnlijk en drukkend gevoel op de borst)
- hartritmestoornissen
- hartinfarct (hartaanval)
- een schildklier die te snel werkt
- migraine
- angstgevoelens
- trillen

Gebruikt u propranolol bij hoge bloeddruk of angina pectoris? Na 6 weken is het effect maximaal. Dan kan uw arts meten hoeveel uw bloeddruk is gedaald. Ook heeft u minder last van pijn of een drukkend gevoel op de borst.

Gebruikt u propranolol bij hartritmestoornissen of trillen? Dan merkt u na ongeveer 1 uur dat propranolol werkt.

Gebruikt u propranolol bij migraine? Dan merkt u pas na een paar maanden of propranolol goed werkt.

Gebruik

Propranolol is er als capsules met vertraagde afgifte en tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik propranolol op vaste tijden. Dan vergeet u het minder snel.

Capsules met vertraagde afgifte

Let op! Hier komt propranolol langzaam uit vrij. U mag deze capsules niet kauwen. Anders komt het medicijn in één keer vrij. Slik de capsules héél door met een half glas water. Vindt u dat moeilijk? Dan kunt u de capsule openmaken. Neem de korrels in met een half glas water. **Niet op de korrels kauwen.**

Tabletten

Slik de tabletten met een half glas water.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- duizelig zijn, licht in het hoofd zijn
- koude handen en voeten
- klachten van maag en darmen. Zoals misselijk zijn, diarree en overgeven.
- moe zijn
- hoofdpijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Propranolol en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met propranolol.



Let op! Rijd géén auto als u last heeft van duizelig zijn, moe zijn of suf zijn.



Let op! met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Door alcohol kunt u sneller duizelig worden.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

