

Samenvatting van propyfenazon, paracetamol en coffeïne

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Paracetamol en propyfenazon zijn pijnstillers en verlagen koorts. Propyfenazon werkt ook licht ontstekingsremmend. Coffeïne zou het pijnstillende effect versterken en werkt opwekkend.

Propyfenazon, paracetamol en coffeïne werkt bij:

- hoofdpijn en migraine
- griep en verkoudheid
- keelpijn
- bijholteontsteking en middenoorontsteking
- spierpijn en gewrichtspijn
- pijn als u ongesteld bent

Propyfenazon, paracetamol en coffeïne werkt binnen een half uur. Het werkt 3 tot 6 uur lang.

Gebruik

Propyfenazon, paracetamol en coffeïne is er als tabletten en als poeder.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken. **Let op!** Gebruik per dag niet meer dan in de bijsluiter staat. Dit is niet goed voor uw lever.

Tabletten

De tabletten doorslikken met een glas water.

Poeder

Doe de inhoud van een zakje in een glas water en drink op.

Gebruik dit medicijn alleen als u pijn heeft. Stop als de pijn is verdwenen. Heeft u na een paar dagen nog steeds pijn? Ga dan naar uw huisarts.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Maagklachten. Zoals buikpijn, misselijk zijn, overgeven, boeren en zuurbranden.
- Darmklachten. Zoals diarree, verstopt zijn en winderig zijn.
- Duizelig en onrustig zijn, moeilijk kunnen slapen en hartkloppingen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! Gebruikt u dit medicijn meer dan 15 dagen per maand tegen hoofdpijn? Dit kan juist voor hoofdpijn zorgen.

Let op! U kunt last krijgen van maagzweren, darmzweren of bloedingen.

- Bent u ouder dan 70 jaar?
 - Gebruikt u bloedverdunders?
 - Heeft u eerder maagzweren of darmzweren gehad?
- Dan heeft u een medicijn nodig om uw maag te beschermen (**maagbeschermer**). Vraag dit aan uw arts of apotheker.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Propyfenazon kan slecht zijn voor de baby. **NIET** gebruiken bij pijn in de tweede helft van uw zwangerschap (vanaf 20 weken).



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

