

Samenvatting van ticagrelor

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Ticagrelor zorgt ervoor dat bloed minder makkelijk samenklontert (antistollingsmedicijn). Hierdoor heeft u minder kans op trombose (bloedstolsel).

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- om trombose te voorkomen. Bijvoorbeeld na een hartaanval en bij angina pectoris (hartkramp).
- na een operatie aan uw hart (dotteroperatie of plaatsen van een stent).

Gebruik

Ticagrelor is er als tabletten en smelttabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten

Slik de tabletten met een half glas water.

Smelttabletten

In de mond laten smelten en daarna doorslikken met een half glas water.

Slik dit medicijn elke dag. Dan heeft u minder kans op een hartaanval.

Bij hartkramp of na een hartaanval gebruikt u dit medicijn meestal langer dan 12 maanden.

Na een operatie aan uw hart moet u dit medicijn meestal 3 tot 12 maanden gebruiken.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- benauwd zijn. Dit gaat meestal binnen een paar weken over. Blijft u last houden van benauwd zijn? Overleg dan met uw arts.
- bloedingen. U krijgt dan sneller blauwe plekken of een bloeding in uw lichaam.

Let op! Krijgt u grote blauwe plekken, bloed in uw poep of urine of ineens zware hoofdpijn? Waarschuw dan **meteen** uw arts.

Waarschuwingen



Let op! Ticagrelor en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met ticagrelor.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

