

# Samenvatting van **varicellazostervaccin**

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Het varicellazostervaccin beschermt tegen een infectie met het varicellazostervirus. Dit virus kan waterpokken en gordelroos veroorzaken.

Uw arts schrijft dit medicijn voor om waterpokken en gordelroos te voorkomen.

## Gebruik

Varicellazostervaccin is er als injectie.

Uw arts of verpleegkundige geeft de injectie in een spier of onder de huid.

U kunt 1 of 2 prikken van het varicellazostervaccin krijgen. Krijgt u 2 prikken? Dan krijgt u het met een tussentijd van 4 tot 12 weken. Dit hangt af van uw leeftijd en welke soort varicellazostervaccin u krijgt.

Krijgt u dit vaccin omdat u in contact bent geweest met iemand die waterpokken heeft? Dan moet u het krijgen binnen 3 dagen nadat u contact heeft gehad met iemand die waterpokken heeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- pijn, rode huid en zwelling op de plaats van de prik
- jeuk
- koude rillingen, koorts, moe zijn
- spierpijn
- hoofdpijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen

**Let op!** Heeft u een orgaantransplantatie gehad? Dan mag u de varicellazostervaccins met het zwakke virus **NIET** krijgen. Het varicellazostervaccin met het dode virus mag wel. Waarschuw altijd uw arts als u een orgaantransplantatie heeft gehad.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen. Bent u nog niet zwanger en krijgt u dit vaccin? Dan moet u betrouwbare anticonceptie gebruiken tot 1 maand nadat u dit vaccin heeft gekregen.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

**Let op!** Heeft uw kind een verminderd immuunsysteem? Dan mag u het vaccin met het zwakke virus **NIET** krijgen.