

Samenvatting van **broomhexine**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Broomhexine maakt dik slijm (taai slijm) in uw longen dunner. U kunt het daardoor makkelijker ophoesten.

Broomhexine werkt bij slijmhoest en de longziekten COPD en cystische fibrose (taaislijmziekte). Bij deze longziekten heeft u last van dik slijm.

U merkt dat het slijm na ongeveer 5 uur losser wordt. Duurt de hoest langer dan 3 weken? Raadpleeg dan uw arts.

Gebruik

Broomhexine is er als tabletten en drank.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met broomhexine

Slik de tabletten met een glas water.

Drank met broomhexine

1. Meet de goede hoeveelheid af met een maatbeker of maatlepel.
2. Drink die hoeveelheid op.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Maagklachten, zoals misselijk zijn, overgeven en diarree
- Zweten
- Duizelig zijn
- Hoofdpijn

Deze bijwerkingen komen zeer zelden voor. Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Gebruik dit medicijn niet tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap. U kunt dit medicijn veilig gebruiken tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

