

Samenvatting van chloorhexidine op de huid

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Chloorhexidine is een ontsmettend middel. Het maakt schoon. Het remt de groei van bacteriën en schimmels.

Chloorhexidine werkt bij:

- Huidinfecties of om deze te voorkomen
- Wonden zoals schaafwonden of snijwonden
- Het voorkomen van steenpuisten
- Het ontsmetten van de huid voor een kleine ingreep
- Het ontsmetten van voorwerpen

Gebruik

Chloorhexidine op de huid is er als crème, oplossing en zeep.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Crème of oplossing met chloorhexidine

- Maak de wond eerst schoon met lauw water. Dep de huid droog.
- Laat een schaafwond eerst even aan de lucht drogen.
- Breng daarna de crème of oplossing aan.
- Breng de crème dun aan.
- Breng de oplossing met een gaasje aan op het wondje en de huid er omheen.

Zeep met chloorhexidine

- Breng de zeepoplossing aan op een vochtige huid. Wrijf een paar minuten in. Er zal schuim ontstaan.
- Spoel af en maak eventueel droog met een steriel gaasje.

Let op! Zorg dat dit middel niet in de ogen, mond of neus komt. Dit veroorzaakt irritatie. Komt het toch in de ogen? Spoel de ogen dan direct uit met water.

Gebruik oplossingen met alcohol of isopropanol alleen op een intacte huid, dus niet op open plekken en wondjes.

Let op! Sommige oplossingen zijn brandbaar. Blijf daarom uit de buurt van open vuur zoals een sigaret.

Dit medicijn kan vlekken maken in kleding of linnengoed.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van lichte irritatie van de huid. Vooral als u dit middel langer dan een paar weken gebruikt of op gevoelige lichaamsdelen. Dit trekt vanzelf weg.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

Heeft u een huidinfectie? Voorkom dat de infectie zich uitbreidt naar andere delen van het lichaam. En voorkom dat u andere mensen besmet. Krab daarom niet aan de plekken. Plak de aangedane huid eventueel af met pleister of verband. Gebruik ook een eigen handdoek.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Let op! Wilt u borstvoeding geven? En smeert u chloorhexidine op of rond de tepel? Smeer dit dan direct ná de borstvoeding. Was het vóór de volgende voeding weer af. Zo krijgt uw baby dit medicijn niet in de mond of op de huid.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

