

Samenvatting van **quetiapine**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Quetiapine is een medicijn tegen psychose.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- psychose door schizofrenie, of door een ernstige depressie
- ernstige depressie (zonder psychose)
- onrust
- manie. U heeft dan te veel energie, heeft weinig slaap nodig en bent veel blij.
- dwangstoornis (OCD)

Dit medicijn werkt binnen een paar uur en blijft ongeveer een halve tot 1 dag werken

Gebruik

Quetiapine is er als tabletten en tabletten met vertraagde afgifte.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met quetiapine

1. **Heel doorslikken** met een half glas water.
2. **Niet fijnmaken** of **erop kauwen**.

Let op! Slik de tabletten met vertraagde afgifte **1 uur voor het eten**.

Op een lege maag werken ze beter.

U kunt dit medicijn een half jaar tot meerdere jaren gebruiken.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf, slaperig of duizelig worden
- hoofdpijn
- problemen met bewegen, zoals het trekken van uw spieren, stijve spieren en niet stil kunnen zitten. Ga dan naar uw arts.
- depressieve klachten
- zwaarder worden
- droge mond en ogen
- seksuele problemen, zoals minder zin hebben in seks

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Eet of drink niet te veel grapefruit(sap). U kunt meer last krijgen van bijwerkingen.



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! U mag **niet** autorijden als u begint met dit medicijn en als de hoeveelheid quetiapine die u gebruikt omhoog gaat. Hoe lang u niet mag autorijden hangt af van hoe vaak u dit medicijn inneemt en de hoeveelheid die u slikt.



Let op! met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



U kunt dit medicijn veilig gebruiken tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap.

Let op! Wilt u dit medicijn tijdens de **laatste 3 maanden** van de zwangerschap gebruiken? De baby kan na de geboorte last krijgen van bijwerkingen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

