

Samenvatting van amitriptyline

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Amitriptyline zorgt dat uw stemming beter wordt en maakt u minder bang. Hierdoor piekert u minder, slaapt u beter en bent u minder prikkelbaar. Het werkt ook tegen pijn.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- depressie
- angst na een schokkende gebeurtenis (posttraumatische stressstoornis)
- zenuwpijn door schade aan de zenuwen
- bedplassen
- spierpijn door fibromyalgie
- hoofdpijn of migraine
- prikkelbare-darmsyndroom met veel pijn
- maagklachten
- problemen met slapen in de laatste levensfase
- kwijlen bij de zenuw- en spierziekte ALS

U merkt niet direct dat u zich beter voelt. Dit duurt meestal een paar weken. Bij zenuwpijn meestal na 1 week en bij bedplassen na een paar dagen. Voelt u zich niet beter? Overleg dan met uw arts.

Gebruik

Amitriptyline is er als tabletten. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf, slaperig of duizelig voelen. Vooral als u dit medicijn nog niet zo lang slikt.
- een droge mond
- hartkloppingen
- verstopping in uw darmen
- zwaarder worden
- misselijk voelen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Gebruikt u amitriptyline al een paar weken en gaat u stoppen? Stop dan niet in één keer, maar bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! U kunt suf, slaperig of duizelig worden. Gebruikt u **meer dan 75 mg per dag**? Dan mag u de **eerste 3 maanden** dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Wordt de hoeveelheid die u slikt hoger? Dan mag u pas weer autorijden als u 3 maanden dezelfde dosering gebruikt.

Let op! Gebruikt u **75 mg of minder per dag**? Dan mag u de **eerste week** dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Wordt de hoeveelheid die u slikt hoger? Dan mag u pas weer autorijden als u 1 week dezelfde dosering gebruikt.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw apotheker of arts of u dit medicijn mag gebruiken..



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

