

Samenvatting van fluticason op de huid

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Fluticason is een corticosteroïd. Het remt ontstekingen en vermindert schilfering, jeuk en zwellingen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij huidziektes met ontstekingen, zoals:

- eczeem
- psoriasis
- jeuk door insectenbeten
- lupus erthematodes
- lichen planus

De jeuk wordt na een paar uur minder. De schilfers en rode huid worden na een paar dagen minder.

Gebruik

Fluticason op de huid is er als crème en zalf. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Smeer dit medicijn op de plekken waar u last van heeft. Uw arts of apotheker legt u uit hoe u dit medicijn moet smeren. Gebruik het topje van uw vinger om te kijken hoeveel u moet gebruiken.



Smeer niet te dik of te dun.

Het is belangrijk dat u de juiste **hoeveelheid** smeert. Dan werkt het goed. En u heeft minder kans op bijwerkingen.

Gebruik ook elke dag een **basiszalf** tegen irritatie van de huid. De ontstoken plekken blijven dan langer weg.

Let op! Gebruik niet meer dan 100 gram fluticason per week. Als u meer gebruikt heeft u grotere kans op bijwerkingen.

Bekijk op Apotheek.nl het plaatje met uitleg over hoeveel u moet smeren.

Scan de QR-code hiernaast om het plaatje te zien.



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van veranderingen van de huid op de plek waar u dit medicijn smeert, zoals lichte of donkere plekken.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! Bel uw arts meteen als u last krijgt van een infectie op uw huid.

- Gebruik dit medicijn niet op een plek met een infectie. Door dit medicijn merkt u minder snel dat u een infectie op uw huid heeft. De infectie kan dan erger worden.

Waarschuwingen



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Besluit u samen met uw arts dat u borstvoeding gaat geven? En smeert u dit medicijn op of rond de tepel? Smeer het dan direct na de borstvoeding op. Was het voor de volgende voeding weer af. Zo krijgt uw baby dit medicijn niet in de mond of op de huid

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

