

Samenvatting van **carbasalaatcalcium bij pijn of ontsteking**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Carbasalaatcalcium **bij pijn of ontsteking** zorgt dat u minder pijn heeft. Het remt ontstekingen en verlaagt koorts.

Carbasalaatcalcium werkt bij:

- pijn door griep of verkoudheid
- gewrichtspijn
- spierpijn
- keelpijn
- hoofdpijn
- migraine
- klachten bij ongesteld zijn (menstruatieklachten)

De pijn wordt **na 30 minuten** minder. Dit medicijn blijft **3 tot 6 uur** lang werken.

Gebruik

Carbasalaatcalcium is er als poeder.

Let op! Dit medicijn is er ook als antistollingsmiddel. Daar zijn andere aanwijzingen en waarschuwingen voor. Deze tekst gaat alleen over carbasalaatcalcium bij pijn of ontsteking.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

1. Los het poeder op in een glas water.
2. Drink dit op.
3. Spoel het glas na met een beetje water en drink dat ook op. Als dit medicijn lang in uw slokdarm achterblijft, kan het uw slokdarm beschadigen.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van maag- en darmzweren of bloedingen. Heeft u makkelijk last van uw maag of gebruikt u dit medicijn voor een lange tijd? Neem carbasalaatcalcium dan tijdens of na het eten in.

Let op! Bent u ouder dan 70 jaar, heeft u eerder een maag- of darmzweer gehad, of gebruikt u bloedverdunders? Dan heeft u een maagbeschermer nodig. Informeer hiernaar bij uw arts of apotheker.

Waarschuwingen



Let op! Carbasalaatcalcium en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met carbasalaatcalcium.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Door alcohol heeft u meer kans op maagklachten.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby. U mag dit medicijn **NIET** gebruiken bij pijn in de tweede helft van uw zwangerschap (vanaf 20 weken).



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat kan slecht zijn voor de baby.