

Samenvatting van clomifeen

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Clomifeen zorgt dat eicellen in uw eierstokken beter rijpen en zet de eisprong in gang. Bij mannen helpt het bij de aanmaak van testosteron.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- vrouwen bij wie het niet lukt om zwanger te raken. Bijvoorbeeld door polycysteus ovariumsyndroom (PCOS).
- mannen die te weinig testosteron aanmaken.

Gebruik

Clomifeen is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

U gebruikt dit medicijn meestal 5 dagen achter elkaar tijdens uw menstruatiecyclus. U krijgt een schema van uw arts.

Krijgt u een IVF-behandeling? Dan haalt uw arts de rijpe eicellen uit uw eierstokken om ze buiten het lichaam te laten bevruchten.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- opvliegers. Dat zijn aanvallen van warmtegevoel, rood hoofd en zweeten
- misselijk voelen, diarree en buikpijn
- gespannen borsten

Let op! Uw eierstokken kunnen te sterk reageren op het medicijn. U kunnen te veel eicellen ontwikkelen. Waarschuw uw arts als u last krijgt van ernstige buikpijn, diarree, overgeven of kortademig zijn.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! U gebruikt dit medicijn om zwanger te worden. Zorg ervoor dat u zeker weet dat u niet zwanger bent als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby. Ook maakt u minder moedermelk aan.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

