

Samenvatting van infliximab

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Infliximab zorgt dat uw afweer minder hard werkt en remt ontstekingen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- gewrichtsontstekingen, zoals reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew
- psoriasis (schilferende huidziekte)
- de chronische darmontstekingen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn
- oogontsteking

Gebruik

Infliximab is er als injectie en infuus.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken en hoe u dit medicijn moet bewaren.

Infuus met infliximab

U krijgt het infuus van uw arts of verpleegkundige in het ziekenhuis. U krijgt het volgens een schema. Elk infuus duurt 2 uur.

Na het infuus moet u 1 à 2 uur wachten, zodat uw arts u kan controleren op bijwerkingen.

Merkt u na het derde infuus nog geen verbetering? Dan zal uw arts een ander medicijn voor u zoeken.

Injectie met infliximab

Als u een aantal infusen heeft gehad, dan kunt u de injectie met infliximab gebruiken.

Uw arts of verpleegkundige legt u uit hoe u moet spuiten bij uzelf.

Scan de **QR-code** hiernaast voor meer informatie over het gebruik op Apotheek.nl.



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Koorts, hoofdpijn, jeuk, huiduitslag of benauwd zijn. Daarom moet u nadat u het infuus heeft gekregen nog 1 tot 2 uur onder controle blijven in het ziekenhuis. De arts kan u dan snel medicijnen geven tegen deze bijwerkingen.
- Ook kunt u overgevoelig reageren. Dat merkt u aan zwellingen, koorts, pijn en huiduitslag. Waarschuw direct een arts als u last krijgt van deze klachten.
Let op! U kunt 3 tot 12 dagen na het infuus nog overgevoelig reageren.
- Vaker infecties krijgen. Bijvoorbeeld van neus, keel, bijholten, blaas of huid. Dit komt doordat infliximab uw lichaamsafweer remt. Overleg bij koorts altijd met uw arts.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

