

Samenvatting van **modafinil**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Modafinil zorgt ervoor dat u beter kunt opletten. En het voorkomt slaapaanvallen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij narcolepsie (slaapziekte).

Binnen 3 uur merkt u dat het medicijn werkt. U kunt beter opletten en heeft minder last van slaapaanvallen.

Gebruik

Modafinil is er als tabletten.

Slik de tabletten met een half glas water.

- Gebruikt u dit medicijn 1 keer per dag? Slik het in de ochtend. Bijvoorbeeld bij uw ontbijt.
- Gebruikt u dit medicijn 2 keer per dag? Slik het in de ochtend en in de middag. Bijvoorbeeld bij het ontbijt en de lunch.

Let op! Neem de laatste tablet niet te laat. Anders kunt u in de avond moeilijk in slaap komen.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn. Dit gaat na een paar dagen over.
- buikpijn, misselijk zijn, diarree of verstopping. Heeft u hier last van? Neem dit medicijn dan met wat voedsel.
- nerveus, duizelig of verward gevoel
- wazig zien, droge mond

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Rijd géén auto als u last heeft van duizelig, nerveus of verward zijn. Of als u wazig ziet.



Let op! met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan de bijwerkingen erger maken.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.



Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

