

Samenvatting van **morning-afterpil met levonorgestrel**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

De morning-afterpil met het progestageen-hormoon levonorgestrel wordt gebruikt als noodanticonceptie. Het voorkomt een zwangerschap na onbeschermd seks.

Gebruik

De morning-afterpil met levonorgestrel is er als tablet.

Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

Slik de tablet zo snel mogelijk na onbeschermd seks. Het beste binnen 12 uur, maar in elk geval binnen 72 uur (3 dagen).

Let op! Neem na het innemen van de morning-afterpil extra voorzorgsmaatregelen, zoals een condoom. Ga daarmee door tot de eerstvolgende menstruatie of totdat u minstens 7 dagen achter elkaar een gewone anticonceptiepil heeft geslikt.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van maagdarmklachten, zoals misselijk zijn en buikpijn. Dit is meestal binnen 2 dagen over.

Let op! Heeft u last van **ernstige waterdunne diarree** of moet u **overgeven binnen 3 uur** na het innemen van de morning-afterpil? Neem dan zo snel mogelijk een nieuw tablet.

Verder kunt u last krijgen van:

- duizelig zijn
- moe zijn
- hoofdpijn
- pijnlijke borsten en tussentijds bloedverlies tot de volgende menstruatie.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! De morning-afterpil met levonorgestrel en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met deze morning-afterpil.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Blijft uw menstruatie langer dan 2 weken weg na de verwachte menstruatiedatum? Doe dan een zwangerschapstest. Blijkt u toch zwanger te zijn? Vraag dan uw arts om advies.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Geef eerst borstvoeding voordat u dit medicijn slikt. De volgende voeding moet u afkolven en weggooien. Na 8 uur kunt u weer borstvoeding geven.