

# Samenvatting van **morning-afterpil met ulipristal**

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

De morning-afterpil met ulipristal wordt gebruikt als noodanticonceptie. Het voorkomt dat u zwanger wordt na onbeschermd seks.

## Gebruik

Morning-afterpil met ulipristal is er als tablet.

Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

Slik de tablet zo snel mogelijk na onbeschermd seks, in elk geval binnen 120 uur (5 dagen).

**Let op!** Heeft u last van **ernstige waterdunne diarree** of moet u **overgeven binnen 3 uur** na het innemen van de morning-afterpil? Neem dan zo snel mogelijk een nieuw tablet.

**Let op!** Neem na het innemen van de morning-afterpil extra voorzorgsmaatregelen, zoals een condoom. Ga daarmee door tot de eerstvolgende ongesteldheid. Of totdat u minstens 14 dagen achter elkaar een gewone anticonceptiepil heeft geslikt.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Moe zijn
- Duizelig zijn
- Hoofdpijn
- Bloedverlies uit de vagina. Dit duurt meestal 2 tot 3 dagen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** De morning-afterpil met ulipristal en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met de morning-afterpil met ulipristal.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Blijft uw ongesteldheid langer dan 2 weken weg na de verwachte datum? Doe dan een zwangerschapstest. Blijkt u toch zwanger te zijn? Vraag dan uw arts om advies.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Nadat u de morning-afterpil met ulipristal heeft ingenomen mag u 1 week lang géén borstvoeding geven. Daarna kunt u weer veilig borstvoeding geven.