

# Samenvatting van **bisacodyl**

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Bisacodyl is een laxeermiddel. Het stimuleert de darmbeweging en laat de poep (ontlasting) meer vocht opnemen. Hierdoor wordt de stoelgang makkelijker.

Bisacodyl werkt bij verstopping. En uw arts kan het voorschrijven om de darm leeg te maken voor een darmonderzoek of operatie.

De tabletten werken na 6 tot 12 uur. De zetpillen werken binnen 20 minuten

## Gebruik

Bisacodyl is er als tabletten en zetpillen.

Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met bisacodyl

Slik de tabletten met een half glas water. Kauw niet op de tabletten.

**Let op!** Slik tabletten niet samen met melk. Het kan dan maagklachten geven.

### Zetpillen met bisacodyl

1. Maak de zetpil een beetje nat.
2. Breng de zetpil in uw anus (poepgat).

Bekijk de **video met uitleg** op Apotheek.nl. Scan de QR-code hiernaast om het filmpje te zien voor de zetpil.



Werkt dit medicijn niet genoeg binnen 3 dagen? Raadpleeg dan uw arts.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- buikpijn of buikkrimp
- diarree

Deze bijwerkingen gaan vanzelf over.

Langdurig gebruik van dit medicijn kan ernstige diarree geven. Heeft u al enkele dagen waterige diarree en een misselijk of zwak gevoel? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen

**Let op!** Gebruik dit medicijn niet langer dan 3 dagen achter elkaar. Behalve als uw arts anders adviseert. Uw darmen wennen anders aan dit medicijn en komen dan niet meer uit zichzelf op gang.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

