

Samenvatting van chloroquine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Chloroquine doodt malariaparasieten en remt ontstekingen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- malaria en om malaria te voorkomen (samen met het malariamiddel proguanil)
- reumatoïde artritis (reuma)
- lupus erythematodes (LE)

Gebruik

Chloroquine is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water tijdens of na het eten. U wordt dan minder snel misselijk.

Hoelang?

- **Voorkomen van malaria:** neem dit medicijn op de dag dat u in het malariagebied aankomt. Neem de dag daarna dit medicijn nog een keer. Daarna slikt u het elke week 1 keer zolang u in het malariagebied bent. Doe dit steeds op dezelfde dag van de week, dan vergeet u het minder snel. Na vertrek gaat u hier nog 4 weken mee door. Maak de hele kuur af.
- **Malaria-aanval:** de behandeling duurt 3 tot 4 weken. Maak de hele kuur af.
- **Reuma:** u merkt na een paar maanden of dit medicijn goed voor u werkt.
- **LE:** als de ziekte ineens erger wordt, gebruikt u dit medicijn meestal 1 tot 2 weken.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- slecht slapen
- depressie
- huidafwijkingen, zoals huiduitslag, jeuk, haaruitval en zwartblauwe verkleuring van nagels of slijmvliezen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën over.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

