

Samenvatting van lercanidipine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Lercanidipine maakt de bloedvaten wijder en verlaagt de bloeddruk.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij hoge bloeddruk.

Lercanidipine maakt uw bloeddruk lager binnen 2 weken.

Gebruik

Lercanidipine is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

Neem dit medicijn in op een lege maag. Dat is minstens 15 minuten voor het eten.

Neem dit medicijn elke dag. Dan heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.

Uitleg van de apotheker
op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- blozen
- duizelig zijn
- hartkloppingen
- opgezwollen enkels en onderbenen.

De meeste bijwerkingen verdwijnen binnen een paar weken.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Of gaan de bijwerkingen niet over? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Eet of drink niet te veel grapefruit(sap). U kunt meer last krijgen van bijwerkingen.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen. Gebruik dit medicijn in ieder geval **niét in de eerste 3 maanden** van de zwangerschap.



Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het veilig voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.