

Samenvatting van **loperamide**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Loperamide remt de beweging van de darmen en zorgt dat het poepgat (anus) beter sluit. Hierdoor neemt diarree af en voelt u minder aandrang.

Loperamide werkt bij:

- Langdurige diarree
- Acute diarree, zoals reizigersdiarree
- Prikkelbaredarmsyndroom met veel diarreeklachten

Gebruik

Loperamide is er als capsules, smelttabletten en drank.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Capsules met loperamide

Neem de capsule met een half glas water.

Smelttabletten met loperamide

Leg de tablet op de tong. Het zal meteen uit elkaar vallen in kleine korreltjes. Water of een andere vloeistof is niet nodig om het medicijn door te slikken.

Drank

1. Meet de juiste hoeveelheid af met het maatbekertje.
2. Drink die hoeveelheid op.
3. Spoel het maatbekertje na met wat water en drink dat ook op.
4. De inhoud van het maatbekertje kan ook gemengd worden met een glas water, thee of limonade.

Gebruikt u dit medicijn bij acute diarree? Acute diarree stopt meestal binnen een paar uur nadat u dit medicijn heeft ingenomen. Ga naar uw arts als u na **2 dagen** nog diarree heeft.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Hoofdpijn
- Duizelig zijn
- Maagdarmklachten, zoals buikpijn, misselijk zijn, droge mond en winderigheid.

Ook kunt u verstopping krijgen. Waarschuw uw arts bij hevige buikpijn.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

