

Samenvatting van **macrogol**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Macrogol houdt water in uw darmen vast. Hierdoor wordt uw poep zachter. U kunt dan makkelijker naar het toilet.

Macrogol werkt bij verstopping in uw darmen.

Uw arts schrijft dit medicijn ook voor:

- als een 'darmspoeling'. Om de darmen leeg te maken bijvoorbeeld voor een darmonderzoek of operatie.
- bij het prikkelbare darmsyndroom met verstopping.

Bij verstopping merkt u na 1 tot 2 dagen verbetering. Het doet dan minder pijn om naar de wc te gaan. Gebruikt u het voor darmonderzoek? Dan moet u binnen 1 tot 2 uur nadat u met dit medicijn bent begonnen naar het toilet.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- opgeblazen gevoel
- misselijk zijn
- buikpijn

Let op! Gaat dit niet vanzelf over of duurt het lang? Of krijgt u opeens erge buikpijn? Waarschuw dan uw arts.

- diarree

Let op! Krijgt u **erge diarree**? Stop dan met dit medicijn en waarschuw meteen uw arts.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Gebruik

Macrogol is er als poeder voor drank, drank om te verdunnen of als drank in een zakje. Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Bij verstopping en prikkelbare darmsyndroom

- Gebruikt u de poeder voor drank? Los het poeder op in een heel glas water. Roer dit goed en drink het meteen op.
- Gebruikt u de drank om te verdunnen? Los de drank op in een half glas water. Roer dit goed en drink het meteen op.
- Gebruikt u de drank in een zakje? Drink de drank op uit het zakje.

Bij darmonderzoek

Begin met dit medicijn de **avond voor uw behandeling** of **op de dag van uw behandeling**. Uw apotheker of arts zal u uitleggen hoeveel uur voor de behandeling u alles van dit medicijn moet hebben opgedronken.

1. Los het poeder op in 1 liter water.
2. Roer dit goed.
3. Drink elke 10 tot 15 minuten ongeveer 250 ml van deze oplossing. Dat is ongeveer een glas. U krijgt uitleg van uw arts of apotheker hoeveel u in totaal moet drinken.
4. Bewaar de oplossing in de koelkast. Dan is het koud en smaakt het beter.

Let op! Gebruikt u het voor darmonderzoek? Dan mag u **2 uur voor uw behandeling geen vast voedsel eten**.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

