

# Samenvatting van magnesiumhydroxide

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Magnesiumhydroxide maakt uw maag minder zuur. Het werkt ook als een laxeermiddel. Het houdt water in uw darm vast, waardoor uw poep zachter wordt. Hierdoor kunt u makkelijker poepen.

Magnesiumhydroxide werkt bij:

- maagklachten (zoals brandend maagzuur)
- verstopping
- prikkelbaredarmsyndroom
- spierkrampen in de kuit tijdens de zwangerschap.

Maagklachten worden binnen 15 minuten minder. Bij verstopping kunt u binnen 2 tot 8 uur makkelijker naar het toilet.

## Gebruik

Magnesiumhydroxide is er als kauwtabletten.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

**Kauw de tabletten goed.** Slik door met een heel glas water.

### Bij maagklachten:

- Neem dit medicijn 1 uur na elke maaltijd en voor het slapen gaan.
- Heeft veel last van uw maag? Neem dan elke 2 uur 1 tablet.
- Neem dit medicijn alleen bij zuurbranden of pijn.
- U kunt dit medicijn gebruiken tot uw maagklachten verdwenen zijn. Merkt u na 2 weken nog geen verbetering? Raadpleeg dan uw apotheker of arts.

### Bij verstopping en prikkelbaredarmsyndroom:

Neem de tabletten goed verdeeld over de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen. Dan vergeet u het minder snel.

### Bij spierkrampen in de kuit:

Neem elke dag 1 tablet. U slikt dit medicijn 2 tot 4 weken.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van diarree.

Dit hoort bij de werking als laxeermiddel. Heeft u hier veel last van? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Magnesiumhydroxide en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met magnesiumhydroxide.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

