

Samenvatting van mebendazol

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Mebendazol doodt wormen en de eieren of larven van wormen.

Mebendazol werkt bij verschillende worminfecties, zoals:

- aarsmaden
- spoelworm
- zweepworm
- mijnworm
- (varkens)lintworm
- sommige andere worminfecties die vooral in de tropen voorkomen

Gebruik

Mebendazol is er als tabletten.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

Bij aarsmaden: 1 tablet en 2 weken later nog 1 tablet.

Bij andere wormen: uw apotheker vertelt u hoe lang uw kuur duurt of kijk op het etiket op het medicijndoosje.

Bij aarsmaden zijn deze maatregelen ook nodig:

- Maak alles wat u met uw handen aanraakt, regelmatig schoon, zoals deurknoppen, kastdeuren, wc-bril, speelgoed.
- Was uw handen met zeep voor het slapengaan, na het opstaan, voor het eten, na het spelen en na een wc-bezoek. Maak goed schoon onder uw nagels.
- Draag elke dag schoon ondergoed en was beddengoed op 60 graden.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van lichte buikpijn

Heeft u veel last van deze bijwerking? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af om er zeker van te zijn dat de worminfectie is verdwenen.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

