

Samenvatting van minocycline

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Minocycline doodt bacteriën (antibioticum).

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij infecties. Zoals:

- huidinfecties
- luchtweginfecties
- infecties van maag en darmen
- ooginfecties
- de geslachtsziekten (soa) gonorroe en syfilis
- lepra

Binnen enkele dagen heeft u minder last van klachten.

Gebruik

Minocycline is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten door met een heel glas water terwijl u rechtop zit of staat. Zo raakt uw slokdarm niet beschadigd.

Een kuur duurt meestal enkele weken tot maanden. Bij de meeste infecties moet u 1 tot 3 dagen door blijven gaan met de kuur nadat uw klachten voorbij zijn.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Misselijk zijn. Heeft u hier last van? Slik dit medicijn dan tijdens het eten.
- Koorts, keelpijn, blaasjes in de mond, bloedneuzen of blauwe plekken. Krijgt u hier last van? Waarschuw dan uw arts.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! U kunt **allergisch** zijn voor dit medicijn. Let op of u erge klachten krijgt, zoals:

- huiduitslag
- benauwd zijn
- koorts
- flauwvallen

Stop dan met dit medicijn en bel meteen uw arts.

Bent u allergisch voor minocycline? Meld dit dan bij uw apotheek

Waarschuwingen



Let op! Minocycline en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met minocycline.



Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën over.



Let op! Blijf uit de felle zon en ga niet onder de zonnebank. Dit medicijn maakt uw huid gevoeliger voor UV-licht. Daardoor kunt u eerder verbranden door de zon.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u langer dan 16 weken zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de botten en de tanden van uw baby. Overleg met uw arts of apotheker.



Let op! Dit medicijn komt in de moedermelk. Geeft u borstvoeding?

- Gebruikt u dit medicijn korter dan 3 weken? Dan kunt u borstvoeding geven.
- Gebruikt u dit medicijn langer dan 3 weken? Dit medicijn is slecht voor de botten en de tanden van uw baby. Overleg met uw arts of apotheker.