

Samenvatting van **tolterodine**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Tolterodine ontspant de spieren van de blaas. Hierdoor past er meer urine (plas) in uw blaas. U hoeft minder vaak te plassen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij urine-incontinentie. U moet dan vaak plassen, maar elke keer dat u plast is het maar een klein beetje.

De tablet werkt binnen 1 uur. De capsule werkt binnen 2 uur.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Droge mond
- Hoofdpijn
- Misselijk zijn en buikpijn. Neem dit medicijn dan in tijdens of vlak na het eten. Dan heeft u daar minder last van.
- Wazig zien
- Moe zijn, duizelig en slaperig zijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Gebruik

Tolterodine is er als tablet en capsule.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tablet met tolterodine

Neem de tablet met een half glas water.

Capsule met tolterodine

- Slik de capsule heel door met water. **Niet kauwen.**
- Kunt u moeilijk slikken? U mag de capsule ook openen en de korrels doorslikken. **Kauw niet op de korrels.**

Merkt u na 4 weken nog onvoldoende effect? Raadpleeg dan uw arts.

Waarschuwingen



Let op! Rijd géén auto als u last heeft van wazig zien of van moe, duizelig en slaperig zijn. Deze klachten verdwijnen na een paar dagen.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

