

Samenvatting van **meclozine**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Meclozine zorgt ervoor dat u minder misselijk bent.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij misselijk voelen en overgeven. Zoals tijdens de zwangerschap en bij reisziekte.

Dit medicijn werkt binnen 2 uur en blijft 8 uur lang werken

Gebruik

Meclozine is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Reisziekte

- Neem het 1 tot 2 uur voor vertrek met wat voedsel.
- Na 6 tot 8 uur kunt u het nog een keer nemen, als u nog klachten heeft nog.

Misselijk voelen en overgeven tijdens de zwangerschap

- Neem het in de avond voor u gaat slapen.
- Helpt dit niet genoeg? Neem het dan in de ochtend nog een keer.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf voelen
- slaperig zijn
- moe zijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! U kunt suf en slaperig worden.

- **Gebruikt u dit medicijn elke dag?** U mag de eerste 3 dagen niet autorijden als u met dit medicijn begint en als uw dosering omhoog gaat. Daarna mag u weer autorijden als u geen last heeft van bijwerkingen.
- **Gebruikt u het 2 dagen of korter?** Dan kunt u 24 uur na de laatste inname weer veilig rijden.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

