

Samenvatting van **atenolol**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Atenolol maakt uw hartslag langzamer en verlaagt uw bloeddruk. Hierdoor heeft uw hart minder zuurstof nodig.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- hoge bloeddruk
- angina pectoris (pijn en drukkend gevoel op de borst)
- hartritmestoornissen
- (voorkomen van) een hartinfarct (hartaanval)
- migraine
- een schildklier die te snel werkt
- angstgevoelens en gespannen zijn
- trillen

Atenolol maakt uw bloeddruk lager binnen 6 weken. Hartkloppingen en trillen worden binnen 1 uur minder.

Gebruik

Atenolol is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.
Slik atenolol op vaste tijden. Dan vergeet u het minder snel.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- duizelig zijn door een lage bloeddruk
- maagdarmklachten
- zweten
- koude handen en voeten.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Atenolol en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met atenolol.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken tijdens de laatste maanden dat u zwanger bent. Mogelijk zal uw arts uw baby extra controleren.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.