

Samenvatting van **bosentan**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Bosentan maakt bloedvaten wijder en gaat ontstekingen en vorming van bindweefsel tegen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij pulmonale arteriële hypertensie
- om zweren aan vingers en tenen door sclerodermie te voorkomen.

Gebruik

Bosentan is er als gewone tablet en disperseerbare tablet (disp of dispers).

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Gewone tablet met bosentan

Innemen met een half glas water.

Disperseerbare tablet met bosentan

Laat de tablet uiteen vallen in een half glas water en drink het op.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- leverschade. U merkt dit aan een gevoelige, opgezwollen buik, buikpijn of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Heeft u hier last van? Waarschuw dan meteen uw arts.
- opgezwollen enkels en onderbenen
- blozen
- verstopte neus

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Bosentan is slecht voor de baby. Uw arts zal voor en tijdens de behandeling regelmatig controleren of u zwanger bent. U moet ervoor zorgen dat u niet zwanger wordt tijdens de behandeling. Tijdens de behandeling en tot 4 weken na het stoppen van bosentan moet u betrouwbare anticonceptie gebruiken. Overleg met uw arts over betrouwbare anticonceptie.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.