

Samenvatting van doxazosine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Amiodaron laat het hart langzamer en regelmatiger kloppen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij hartritmestoornissen, zoals boezemfibrilleren

Binnen enkele dagen tot 1 week worden uw hartkloppingen minder.

Gebruik

Amiodaron is er als tabletten en injecties.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

De tabletten doorslikken met een half glas water tijdens of vlak na het eten.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- gevoeliger worden voor UV-licht. Bijvoorbeeld van de zon, de zonnebank of UV-lamp.
- maagklachten, zoals misselijk zijn, overgeven en smaakverandering.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Merkt u dat uw hartklachten erger worden? Waarschuw dan uw arts.

Waarschuwingen



Let op! Amiodaron en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met amiodaron.



Let op! Blijf uit de felle zon en ga niet onder de zonnebank. Dit medicijn maakt uw huid gevoeliger voor UV-licht. Daardoor kunt u eerder verbranden door de zon.



Let op! Eet of drink niet te veel grapefruit(sap). U kunt meer last krijgen van bijwerkingen.[QR toevoegen]



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik. Wilt u zwanger worden? Overleg met uw arts. Dit medicijn blijft nog maanden achter in uw lichaam.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby