Samenvatting van **flucloxacilline**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Flucloxacilline doodt bacteriën (antibioticum).

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij infecties van:

- de huid, zoals ontstoken eczeem, krentenbaard, abces, steenpuisten en wondroos
- de luchtwegen, zoals de keel en longen
- de amandelen
- de gehoorgang
- het hersenvlies

Flucloxacilline werkt binnen een paar dagen.

Gebruik

Flucloxacilline is er als capsules en drank. Het wordt ook als infuus en injectie gegeven. Deze tekst gaat alleen over de capsules en drank.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

- Blijf na inname van dit medicijn een **half uur rechtop** zitten of staan. Ga in die tijd niet liggen.
- Neem dit medicijn in op een lege maag. Dat is 1 uur voor of 2 uur na het eten.
- Is dit niet mogelijk? Of heeft u last van bijwerkingen? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn ook met voedsel mag nemen.
- Neem het goed verdeeld over de dag in. Het werkt dan het beste.

Capsules met flucloxacilline

1. Innemen met een groot glas water (250 ml).
2. Niet kauwen.

Drank met flucloxacilline

1. Schud de fles goed.
2. Meet de goede hoeveelheid af met het maatbekertje of de maatlepel.
3. Slik de drank door.
4. Gebruikt u een maatbekertje? Spoel het na met wat water en drink dat ook op.
5. Drink daarna een groot glas water (250 ml).

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijk zijn, overgeven
- huiduitslag

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! U kunt **allergisch** zijn voor dit medicijn. Let op of u erge klachten krijgt, zoals:

- huiduitslag
- benauwd zijn
- koorts
- flauwvallen

Stop dan met dit medicijn en bel meteen uw arts. Bent u allergisch voor flucloxacilline? Meld dit dan bij uw apotheek.

Waarschuwingen

Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën.

U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent of zwanger wilt worden.

U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

02-07-2026

*Lees voor gebruik altijd de **officiële bijsluiter** in het doosje. Gebruik het medicijn zoals uw arts en apotheker hebben uitgelegd. Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP. De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.*

Apotheek.nl