

Samenvatting van hepatitis-A-vaccin

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Hepatitis-A-vaccin beschermt tegen infecties met het hepatitis A-virus. Dit virus zorgt voor leverontsteking.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij mensen die meer kans hebben om besmet te raken met het hepatitis-A-virus.

Na 2 tot 4 weken bent u beschermd tegen hepatitis A.

Gebruik

Hepatitis-A-vaccin is er als injectie.

Uw arts of verpleegkundige geeft de inenting (prik) in een spier.

Meestal krijgt u 2 inentingen:

- De eerste inenting beschermt u ongeveer 1 jaar.
- U krijgt meestal na een half jaar tot 1 jaar een tweede inenting. Daarna bent u minstens 30 jaar beschermd.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- pijn, rode huid, gevoeligheid en zwelling op de plaats van de injectie
- griepklachten
- hoofdpijn
- vermoeid zijn
- prikkelbaar zijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker
op video? Scan hier:

