

Samenvatting van levodopa met benserazide

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Levodopa werkt hetzelfde als dopamine, een lichaamseigen stof. Dopamine is nodig voor veel hersenfuncties, zoals de aansturing van spieren. Benserazide zorgt dat levodopa langer werkt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- de ziekte van Parkinson
- rusteloze benen (restless legs)

Ziekte van Parkinson: na een paar dagen tot weken bent u minder stijf en kunt u makkelijker bewegen. Uw arts zal regelmatig met u bespreken of dit medicijn voldoende bij u werkt.

Rusteloze benen: werkt binnen 1 tot 3 uur. Na 1 of meer nachten kunt u beoordelen of dit medicijn voldoende werkt.

Gebruik

Levodopa met benserazide is er als dispergeerbare tabletten (oplostabletten), gewone tablet, gewone capsule en capsule met gereguleerde afgifte (mga).

Dispergeerbare tablet met levodopa en benserazide

- Laat de tablet uiteen vallen in water.
- Roer even en drink dan meteen op.
- Spoel het glas daarna met een beetje water en drink dat ook op.

Gewone tablet en capsule met levodopa en benserazide

Slik de tablet of capsule met een half glas water.

Capsule met gereguleerde afgifte (mga)

Slik de capsule heel door met een half glas water zonder te kauwen.

Let op! Neem dit medicijn op een **lege maag**, dan werken ze het best. Lukt innemen op een lege maag niet? Neem dit medicijn dan in met voeding die geen of weinig eiwitten bevat. Neem dit medicijn niet in met melkproducten.

Gebruikt u dit medicijn bij de ziekte van parkinson?

Neem het dan verdeeld over de dag in. Dan werkt dit medicijn steeds sterk genoeg.

Gebruikt u dit medicijn bij rusteloze benen? Neem het dan in de avond voor het slapen.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- duizelig of misselijk zijn door dit medicijn. Dit gaat meestal binnen een paar weken over, als u gewend bent aan dit medicijn.
- droge mond
- hartkloppingen
- problemen met bewegen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! U kunt ook slaperig worden, ineens slaapaanvallen krijgen, of in de war raken. Hierdoor kunt u minder snel reageren. U mag de eerste dagen niet autorijden. Daarna mag u alleen autorijden als u hier geen last van heeft. Als u last heeft van slaapaanvallen mag u niet autorijden.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Het kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Het kan er voor zorgen dat de borstvoeding minder wordt. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

