

Samenvatting van **quinagolide**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Quinagolide remt prolactine. Het werkt hetzelfde als dopamine, een stof die van nature in de hersenen voorkomt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij te veel aanmaak van prolactine. Bijvoorbeeld door een gezwel in uw hersenen of gebruik van andere medicijnen.

Gebruik

Prolactine is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

- Slik de tablet met een half glas water en wat eten.
- Neem dit medicijn in de avond innemen voor u gaat slapen.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- maagdarmklachten, zoals misselijk zijn en overgeven.
- hoofdpijn
- moe zijn
- duizelig zijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! U mag de **eerste paar dagen** niet autorijden als u met dit medicijn begint. Daarna mag u weer autorijden als u geen last heeft van bijwerkingen. U mag **NIET** autorijden als u last heeft van **plotselinge slaapaanvallen**.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het kan ervoor zorgen dat de borstvoeding stopt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

