

Samenvatting van ramipril

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Ramipril verlaagt de bloeddruk en verbetert de pompkracht van het hart.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- hoge bloeddruk
- hartfalen
- na een hartinfarct (hartaanval)
- nierziekten

Het maakt uw bloeddruk binnen 3 tot 6 uur lager. Bij hartfalen merkt u dat u minder benauwd bent en dikke enkels heeft.

Gebruik

Ramipril is er als tablet en capsule.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet of capsule met een half glas water.

Gebruik dit medicijn **elke dag**. Dan heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- duizelig worden. Dat gebeurt vooral als u begint met dit medicijn. Neem het medicijn daarom de eerste dagen in de avond in, als u op uw bed zit. Dan kunt u gaan liggen als u duizelig wordt.
- kriebelhoest. Overleg met uw arts als dit niet overgaat.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Ramipril en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met ramipril.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.



Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

