

Samenvatting van cabergoline

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Cabergoline remt de aanmaak van het hormoon prolactine.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij te veel aanmaak van prolactine
- om de aanmaak van melk te voorkomen of te stoppen na de bevalling of het afbreken van een zwangerschap.

Gebruik

Cabergoline is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

- Neem de tablet in met een half glas water.
- Neem dit medicijn in met wat eten. Dan heeft u minder kans op maagklachten.
- Kies vaste tijden en dagen waarop u dit medicijn inneemt. Dan vergeet u minder snel een tablet.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- maagdarmklachten
- hoofdpijn
- duizelig zijn
- suf zijn, een zwak gevoel en moe zijn
- een ontsteking van het hartzakje en vocht rond het hart. Krijgt u last van benauwd zijn, opgezwollen armen en benen of pijn op de borst? Raadpleeg dan uw arts.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! U mag de **eerste paar dagen** niet autorijden als u met dit medicijn begint. Daarna mag u weer autorijden als u geen last heeft van bijwerkingen. U mag **NIET** autorijden als u last heeft van **plotselinge slaapaanvallen**.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het kan ervoor zorgen dat de borstvoeding stopt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.