

# Samenvatting van cinnarizine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Cinnarizine zorgt dat u minder misselijk bent. Het is ook een anti-allergiemedicijn.

Cinnarizine werkt bij:

- reisziekte
- allergie (zoals hooikoorts)

Ook kan het worden gebruikt bij draaiduizeligheid door een verstoord evenwichtsorgaan. Maar het is niet bewezen dat het hiervoor werkt.

Dit medicijn werkt na ongeveer een half uur en blijft 4 tot 6 uur lang werken

## Gebruik

Cinnarizine is er als tablet.

Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

### Bij reisziekte

- Neem dit medicijn een half uur tot 2 uur voor vertrek in met wat voedsel.
- Na 6 tot 8 uur kunt u het als u wilt nog een keer nemen.
- Gebruik dit medicijn niet meer dan 3 keer op een dag.

### Bij allergie en draaiduizeligheid

- Heeft u voortdurend klachten? Gebruik dit medicijn elke dag.
- Heet u af en toe last? Neem dit medicijn in als u klachten krijgt. Of 1 uur voor u verwacht last te krijgen.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf zijn
- slaperig zijn
- problemen met de coördinatie
- wazig zien
- droge mond.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Rijd geen auto als u last heeft van bijwerkingen zoals suf zijn, slaperig zijn of wazig zien. Gebruikt u cinnarizine met chloorcyclizine **2 dagen of korter**? Dan mag u **24 uur** niet autorijden na iedere inname. Daarna mag u alleen autorijden als u geen last heeft van bijwerkingen. Gebruikt u cinnarizine met chloorcyclizine **elke dag**? Dan mag u **3 dagen** niet autorijden als u start met dit medicijn of als de dosis omhoog gaat. Rijd daarna alleen als u geen last heeft van bijwerkingen.



**Let op** met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Dit kan u nog suffer maken.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Gebruik dit medicijn **NIET** vlak voor de bevalling.



**Let op!**

- Geeft u borstvoeding? En gebruikt u dit medicijn langere tijd? Dan is het niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
- Gebruikt u dit medicijn af en toe? Dan kunt u dit medicijn veilig gebruiken.