

Samenvatting van **doxazosine**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Doxazosine verwijdert de bloedvaten en ontspant de spieren van blaas en prostaat.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- hoge bloeddruk
- problemen met plassen door een vergrote prostaat
- nachtmerries en slaapproblemen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Hoge bloeddruk: het kan 4 weken duren tot het volledige effect op de bloeddruk bereikt is. Dan is te meten hoeveel uw bloeddruk is gedaald.

Vergrote prostaat: Merkt u binnen 6 weken geen verbetering van de prostaatklachten? Overleg dan met uw arts.

Gebruik

Doxazosine is er als tablet

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

U mag de tabletten niet **fijnmaken of kauwen**. Anders komt dit medicijn in één keer vrij. Slik de tablet héél door.

Gebruik dit medicijn bij een hoge bloeddruk **elke dag**. Dan heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- (draai)duizelig zijn
- hoofdpijn
- verstopte neus
- maagdarmklachten

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken tijdens het 1e trimester van de zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Ook kunt u dit medicijn beter NIET gebruiken tijdens het 2e en 3e trimester van de zwangerschap. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

