

Samenvatting van isosorbidedinitraat tabletten

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Isosorbidedinitraat maakt de bloedvaten wijder. Vooral de bloedvaten die naar het hart toe leiden. Hierdoor stroomt het bloed minder krachtig het hart binnen. Het hart hoeft dan niet zo hard te werken.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- angina pectoris (hartkramp), als u een aanval van pijn op de borst heeft.
- hartfalen

Gebruik

Isosorbidedinitraat tabletten zijn er als gewone tabletten en tabletten met geregleerde afgifte (MGA).

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Gewone tabletten met isosorbidedinitraat

Slik de tablet met een half glas water.

Isosorbidedinitraat tabletten met geregleerde afgifte (MGA)

- Slik de tablet heel door met een half glas water.
- De tablet niet kauwen of fijnmaken.

Als dit medicijn de hele dag in uw bloed zit, werkt het minder goed. Gebruikt u de gewone tabletten? Neem de laatste tablet van de dag in bij het avondeten. Gebruikt u de tablet met geregleerde afgifte (MGA)? Neem de laatste tablet van de dag niet later in dan 16:00 uur.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- blozen
- zweten
- duizelig zijn
- verhoogde hartslag
- moe en zwak gevoel
- slaperig zijn

Deze klachten verdwijnen als uw lichaam gewend is aan het medicijn. Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

