

Samenvatting van **rasagiline**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Rasagiline remt de afbraak van dopamine in de hersenen. Dopamine is een stof die van nature in de hersenen voorkomt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij de ziekte van Parkinson.

Meestal merkt u binnen een paar weken tot enkele maanden dat u minder stijf bent en makkelijker kunt bewegen.

Gebruik

Rasagiline is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Neem de tablet met een half glas water.

U gebruikt het 1 keer per dag. Kies vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- maagdarmklachten
- een griepig gevoel

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Rijd géén auto als u last heeft van duizelig zijn, slaperig zijn, plotselinge slaapaanvallen, in de war zijn en hallucinaties. Plotselinge slaapaanvallen voelen de meeste mensen niet aankomen. U mag NIET autorijden als u daar wel eens last van heeft.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt dit kan u nog suffer maken.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Wel is bekend dat dit medicijn ervoor kan zorgen dat de borstvoeding vermindert of zelfs stopt. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker
op video? Scan hier:

