

Samenvatting van repaglinide

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Repaglinide verlaagt de bloedsuiker. Te veel suiker in bloed maakt ziek en is schadelijk voor hart en bloedvaten, ogen, nieren en zenuwen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij diabetes mellitus (suikerziekte).

De klachten van diabetes zoals dorst, vaak plassen en een droge mond verdwijnen meestal binnen een paar dagen. Binnen een paar weken bent u minder moe.

Gebruik

Repaglinide is er als tablet.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Neem dit medicijn met een half glas water **vlak voor elke maaltijd**. Dat is 15 tot 30 minuten voor het eten.

Let op! Gebruik dit medicijn elke dag. Dan heeft u minder kans op schade door diabetes. Zoals wonden die slecht genezen, zenuwpijn, nierproblemen, hart- en vaatziekten en blind worden.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

De belangrijkste bijwerking van repaglinide is een hypo. Dit ontstaat als u het samen met andere bloedsuikerverlagende medicijnen gebruikt. Bij een hypo heeft u te weinig suiker in uw bloed. U merkt dat aan:

- honger,
- bleke huid,
- trillen,
- zweten,
- duizelig zijn,
- hoofdpijn,
- moe zijn
- flauwvallen

De klachten bij een hypo zijn bij iedereen anders. Misschien heeft u niet al deze klachten als u een hypo heeft.

Wat moet u doen bij een hypo? Eet of drink bij een hypo snel iets met (druiven)suiker. Eet daarna een boterham.

Waarschuwingen



Let op! U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

Let op! Door een hypo kunt u een ongeluk krijgen.

Wat moet u doen als u wilt autorijden?

- Rijd alleen als u zich goed voelt.
- Meet voor het rijden uw bloedsuiker.
- Rijd alleen als u weet dat u een hypo kunt voelen aankomen.
- Overleg met uw arts of u veilig kunt autorijden.



Let op! Door alcohol kunt u een hypo krijgen. En uw lichaam voelt minder snel een hypo aankomen. Drink liever geen alcohol. Of drink minder dan 2 glazen alcohol per dag



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.